

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», г. Пермь,
ул. Куйбышева, 50 а**

Гигиеническое обучение

- гигиеническое обучение (сантехминимум) для работников общепита, торговли, коммунального и бытового обслуживания, туристических фирм, фармации, воспитателей и преподавателей, водителей автотранспортных средств и др.
- личные медицинские книжки (представить фото 3х4)
- санитарные правила, информационные материалы на электронном носителе по желанию заказчика.
- памятки для населения на безвозмездной основе.

Режим работы

Пн-Пт 9.00-16.00
обед 12.00-13.00
Сб, Вс выходной
Тел. 236-48-04

Пн-Пт 9.00-17.00
обед 12.00-13.00
Сб, Вс выходной
Тел. 236-48-77

Консультационный центр для потребителей

- Разрешение конфликтных ситуаций, связанных с покупкой некачественного товара или оказанием некачественной услуги.
- Санитарно-эпидемиологическая и товароведческая экспертиза некачественного товара или услуги.

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»**

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 а
[www. 59.rospotrebnadzor.ru](http://www.59.rospotrebnadzor.ru)

Телефон: 236-48-04
Эл. почта: go-fgu@mail.ru



Отдел гигиенического обучения
и консультационных услуг

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

КОКЛЮШ



ПАМЯТКА
ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ

Коклюш

Коклюш – это острая, циклически протекающая инфекционная болезнь, характеризующая приступами спазмического кашля, поражением дыхательной и сосудистой системы.

Возбудитель коклюша чувствителен к факторам внешней среды (погибает под воздействием солнечного света в течение 1 часа), легко поддается действию любых химических средств.

Восприимчивость к коклюшу всеобщая, но наибольшая заболеваемость регистрируется преимущественно среди детского населения в возрасте до 5 лет, «группой риска» является дети до года. В настоящее время отмечается относительный рост заболеваемости коклюшем у детей школьного возраста.

Основной механизм и путь передачи инфекции – аэрозольный (воздушно-капельный).

Передача возбудителя (заражение) возможна лишь при продолжительном, непосредственном общении с больным человеком, при чихании, кашле, громком разговоре, плаче через воздух посредством мельчайших частичек слизи, выделяемых больным во время выдоха на расстояние 1-2 метра.

Инкубационный период при всех формах коклюша колеблется от 7 до 21 дня.

Клиническим проявлением инфекции является кашель, который нарастает, приобретая все более упорный, навязчивый, а затем приступообразный характер. Типичный приступ коклюшного кашля состоит из быстро следующих друг за другом дыхательных толчков, которые чередуются один за другим до 40 раз в сутки. Длительность заболевания от 1 до 3 недель.

Если у Вашего ребенка или другого члена семьи отмечаются подобные симптомы заболевания – необходимо срочно обратиться к врачу. Своевременная диагностика заболевания не только поможет начать правильное лечение, но и снизить риск инфицирования окружающих людей.

Профилактические мероприятия.

Важнейшей мерой предупреждения коклюша является специфическая профилактика, которая проводится вакциной АКДС.

Первичная вакцинация детей против коклюша начинается с трех месяцев. Она проводится троекратно с интервалом в 45 дней. Ревакцинация у детей осуществляется через 1,5 – 2 года после законченной вакцинации.

Среди правильно привитых детей почти в половине всех случаев коклюш протекает в стертой форме, а осложнения в период заболевания у них наблюдаются в 4 раза реже, чем у тех детей, которые не привиты.

Сроки проведения вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Возраст	Вид прививки
3 месяца	Первая прививка (вакцинация) против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита.
	Вторая прививка (вакцинация) против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита.
4,5 месяца	Третья прививка (вакцинация) против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита.
	Повторная прививка (ревакцинация) против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита.
6 месяцев	
18 месяцев	

